

Granulotec® +

All in One



Granulotec®+ est une préparation sans eugénol, bactéricide, non-résorbable et radio-opaque pour l'obturation permanente après pulpotomie ou pulpectomie.

Traitement du Granulome

Pulpectomie

Granulotec® + assure :

- Une obturation permanente et étanche.
- Une action bactéricide qui permet l'asepsie du traitement et l'élimination de l'infection.
- La résorption du granulome, ainsi que la régénération des tissus périapicaux.
- Une obturation coronaires directes avec des composites et si nécessaire, un re-alésage aisé du canal pour la pose d'inlay-core ou de bridge.



Maintien de la vitalité Pulpaire

Pulpotomie

Granulotec® + assure :

- Un traitement antiseptique, prévenant la contamination microbienne de la pulpe.
- Une cicatrisation du moignon pulpaire à l'interface caméro-canalair.
- Un maintien de la structure et de la vitalité pulpaire.
- Un traitement simple pour une dent vivante durable.



Swiss quality
dental products

Description

Granulotec® + se compose d'une poudre et d'un liquide qui, mélangés ensemble forme une pâte radio-opaque. Idéale pour les traitements d'obturation permanente, Granulotec® + agit sur les dents atteintes de pathologies pulpaires vitales (pulpites) ou infectées, après pulpotomie ou pulpectomie.



Contenu de la portion et références	REF
Portion de 20 gr de poudre + 15 ml de liquide + boure-pâte	11573

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en suisse

Indications spécifiques d'utilisation

Pulpectomie:

Granulotec® + s'utilise dans les cas d'une obturation définitive des canaux radiculaires de dents vitales ou infectées, plus spécifiquement en présence d'un granulome.

Pulpotomie:

Chez un patient adulte :

Traitement des pulpites sur les molaires permanentes vitales.

Traitement des molaires présentant un canal calcifié (pour la gérontologie).

En pédodontie :

Traitement des pulpites les molaires primaires vitales.

Traitement des pulpites sur molaires vitales permanentes immatures, permettant un développement radiculaire complet de la dent.

Traitement des molaires primaires infectées même en présence d'un abcès*.

* Cette indication est la seule exception à la règle de la pulpotomie sur les dents vitales, et doit être traitée par pulpotomie simple, sans dépasser le plancher de la chambre pulpaire.

Méthode traditionnelle :

Consistance crémeuse

Pour un usage en pulpectomie ou pulpotomie

Autre méthode :

Consistance mastic souple

Pour un usage en spécifique en pulpotomie

Pour une **préparation optimale**, consultez ce **tutoriel vidéo**.

