

Tricresol & Formalin

Solution for root canal disinfection

Composition

Tricresol 35 %, Formaldehyde (40 %) 19 %, excipient ad 100 %

Properties

Since its early introduction in 1905 by Buckley, Formocresol, thanks to its antibacterial activity, has proved as efficient in vital pulpotomy as for root canal treatment.

The Formaldehyde acts as a powerful, long-lasting germicide and also renders inert any remaining organic materials. The Cresol acts as an efficient antiseptic and also reduces any irritation that could be caused by the Formaldehyde.

Indications

- Treatment of 4th degree caries
- Root canal dressing, specially when fistula have developed

Directions for use

Clean and prepare the canal. Dip a cotton gauze into the solution, squeeze until no longer dripping and insert into the canal. Seal with a temporary cement. Remove the temporary filling and the gauze after 3 to 5 days and check the asepsis of the canal. Where necessary, the treatment can be renewed. Close cavity with a permanent filling.

Warning

Contains Formaldehyde. Toxic by inhalation and ingestion. May cause irritation, burns or hypersensitization if in direct contact with the skin. In case of direct contact with the eyes, rinse liberally with running water and consult a physician.

Storage

Store at room temperature between 5°C and 30°C, protected from direct light.

Shelf-life 5 years.

Packaging

Bottle of 15 ml

For dental professional use. Made in Switzerland.

REF

11373

MODE D'EMPLOI

FR

Tricresol & Formalin

Solution pour la désinfection canalaire

Composition

Tricrésol 35 %, formaldéhyde (40 %) 19 %, excipient ad 100 %

Propriétés

Depuis son introduction en 1905 déjà par Buckley, le formocrésol, grâce à son activité anti-bactérienne, a largement prouvé son efficacité tant dans les cas de pulpotomie que lors de traitement des canaux.

La formaldéhyde agit grâce à son puissant et durable pouvoir germicide ainsi que par sa capacité à rendre inerte les matériaux organiques qui pourraient subsister dans le canal. Le crésol agit comme un antiseptique actif et atténue l'irritation que pourrait causer la formaldéhyde.

Indications

- Traitement des caries du 4^e degré
- Pansement canalaire, dans les cas de développement d'une fistule

Mode d'emploi

Après parage canalaire, introduire dans le canal une mèche de coton imbibée de solution et essorée. Sceller à l'aide d'un ciment provisoire. Désobturer après 3 à 5 jours, enlever la mèche de coton et contrôler l'asepsie du canal. En cas de nécessité, le traitement peut être renouvelé. Obturer définitivement.

Mise en garde

Contient du formaldéhyde. Toxique par inhalation et ingestion. Au contact de la peau, peut causer des irritations, des brûlures ou une hypersensibilité. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante et consulter un médecin.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe.

Durée de conservation 5 ans.

Conditionnement

Flacon de 15 ml

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Tricresol & Formalin

Раствор для дезинфекции корневых каналов

Состав

Трикрезол 35 %, формальдегид (40 %) 19 %, вспомогательные вещества до 100%

Описание

Формокрезол, со времен своего появления в 1905 году (Buckley) не утратил своей актуальности. Его антибактериальная активность оправдывает применение препарата как для дезинфекции корневых каналов, так и для обработки глубоких кариозных полостей, в том числе при вскрытии пульпарной камеры.

Формальдегид оказывает сильный и длительный бактерицидный эффект, а также инактивирует остаточные органические вещества пульпы зуба. Крезол обладает выраженным антисептическим эффектом и снижает раздражающее действие формалина на окружающие ткани.

Показания

- Антисептическая обработка корневых каналов при лечении хронического язвенного пульпита (K04.4) и некроза пульпы (K04.1)
- Антисептическая обработка глубоких кариозных полостей
- Антисептическая обработка корневых каналов при лечении периодонтита, особенно со свищем

Способ применения

Механически и медикаментозно обработать корневой канал, тщательно просушить. Смочить ватный шарик в препарате, отжать и поместить в пульпарную камеру. Закрывать временной пломбой. Оставить в качестве антисептической повязки на 3-5 дней. При необходимости повторить аппликацию. Тщательно удалить остатки препарата перед постоянным пломбированием

Меры предосторожности

Содержит токсичный при вдыхании и приеме внутрь формальдегид. При контакте с кожей может вызвать раздражение и гиперчувствительность. При попадании в глаза – тщательно промыть проточной водой и обратиться к специалисту.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 5 года.

Упаковка

флакон 15 мл

только для профессионального применения в стоматологии, сделано в швейцарии.

APTC

11373



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18

1800 Vevey . Switzerland

pd-dental.com

pd-classics.com

© PD 260504